



Embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea previa

Irene Baño Martínez, Rosa Barrachina Tortajada, M^a Rita Viñoles Ferreiro, Susana Gallach Bañón, Caterina Canepele, Fernando Naranjo De la Puerta

Hospital Universitario De la Ribera

Embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea previa

Irene Baño Martínez, Rosa Barrachina Tortajada, M^a Rita Viñoles Ferreiro, Susana Gallach Bañón, Caterina Canepelle, Fernando Naranjo De la Puerta.
Hospital Universitario De la Ribera

INTRODUCCIÓN: La implantación del embarazo sobre la cicatriz en una cesárea anterior es la forma menos frecuente de embarazo ectópico, no obstante, se ha visto incrementado en los 10 últimos años como consecuencia del crecimiento de la tasa de cesáreas.

Su incidencia oscila entre 1:1800 a 1:2216 gestaciones, y constituye el 6,1% de todos los embarazos ectópicos con al menos una cesárea previa.

Embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea previa

Irene Baño Martínez, Rosa Barrachina Tortajada, M^a Rita Viñoles Ferreiro, Susana Gallach Bañón, Caterina Canepelo, Fernando Naranjo De la Puerta.
Hospital Universitario De la Ribera

CASO CLÍNICO:

Mujer de 36 años de edad, sin antecedentes de interés.
TPAL (1-0-0-1) Cesárea en 2007.

Consulta por test de embarazo positivo y dolor en hipogastrio. Amenorrea de 5+3.
A la exploración se observa un útero con endometrio secretor, anexos normales, no líquido libre. B-hcg 1463.

En 48 horas debuta con metrorragia.
Se visualiza imagen compatible con saco gestacional en zona de histerotomía de 7mm con vesícula vitelina.

B-hcg 2063, diagnosticándose de Embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea.
Administración de 75mg de Metotrexate.



Embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea previa

Irene Baño Martínez, Rosa Barrachina Tortajada, M^a Rita Viñoles Ferreiro, Susana Gallach Bañón, Caterina Canepelle, Fernando Naranjo De la Puerta.
Hospital Universitario De la Ribera

- 6+2s.g: B-hcg3516
- 6+4s.g: B-hcg4323, ECO TV saco gestacional irregular en cicatriz de cesárea de 8mm, vesícula aberrante y embrión de 2mm sin latido cardiaco.
- 7s.g: B-hcg 470, Nueva administración de Metotrexate 65mg
- 7+2s.g: B-hcg2637 ECOTV saco gestacional en cicatriz de 16mm con VV de 6,7mm y botón embrionario sin latido.
- 8+2s.g: B-hcg1204, persiste imagen de ectópico, anexos normales, no líquido libre.
- 9s.g: B-hcg710
- 10+4s.g: B-hcg173, imagen quística en istmo de 17mm, LE fina, no se visualiza embrión ni VV.



Embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea previa

Irene Baño Martínez, Rosa Barrachina Tortajada, M^a Rita Viñoles Ferreiro, Susana Gallach Bañón, Caterina Canepale, Fernando Naranjo De la Puerta.
Hospital Universitario De la Ribera

Tras negativización de Betas, persiste imagen quística de 12mm hasta dos meses después de la administración de Metotrexate, con segmento restante de 2,4mm.



El tratamiento óptimo del embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea es incierto. Incluye tratamientos únicos o combinaciones de los mismos: legrado, histeroscopia, Metotrexate, laparotomía, embolización de uterinas.

En gestaciones posteriores existirá un aumento de complicaciones como acretismos placentarios y roturas uterinas, estando indicado acabar en cesárea electiva.